

	RECOMENDACIONES Y PREPARACION PARA EXAMENES DE TOMOGRAFIA	CÓDIGO: RD-FTO-049
		VERSIÓN: 01
	RADIOLOGÍA	15/12/2017
		Página 1 de 1

Por favor revisar los requisitos específicos para la toma de su examen en caso de no cumplir con alguno de ellos, la institución no puede realizar la toma de su examen y debe solicitar nueva cita.

CONFIRMAR CON LA PERSONA QUE LE ASIGNA LA CITA SI EL EXAMEN ES CON O SIN CONTRASTE, (REVISE SU ORDEN MEDICA) PARA TENER EN CUENTA SU PREPARACION.

DOCUMENTOS PARA TOMA DE CUALQUIER EXAMEN

- Traer Orden médica y documento de identidad.
- Traer autorización dirigida a la clínica miocardio
- Traer Historia clínica reciente, exámenes anteriores de radiología como RX, resonancia magnética, tac y ecografías.

INDICACIONES PARA TOMOGRAFIA AXIAL SIMPLE

- Paciente mayor de 60 años venir con acompañante
- No traer objetos de valor Celulares, joyas, ni objetos metálicos, traer ropa cómoda.
- En caso de estar en embarazo o con sospecha de ello por favor informar al personal de salud.
- En caso de estar en tratamiento médico **No** debe suspender medicación formulada, por favor avisar al personal de salud.
- Llegar 30 minutos antes de la cita para iniciar el proceso de facturación

INDICACIONES PARA TOMOGRAFIA CON CONTRASTE

- En caso de estar en embarazo o con sospecha de ello por favor informar al personal de salud.
- En caso de haber presentado alergias a medios de contraste, alimentos o medicamentos anteriormente, debe informar al personal de salud.
- Traer resultado de creatinina no mayor a un mes y con resultado menor a 1,2
- Todo paciente debe venir con acompañante
- No traer objetos de valor Celulares, joyas, ni objetos metálicos, traer ropa cómoda.
- Debe tener 8 horas de ayuno.
- Para el **examen de abdomen y/o Pelvis** con contraste debe estar **dos horas** antes para la preparación, traer dos botellas de agua sin gas.
- Para los demás exámenes que requieran contraste llegar 30 minutos antes
- Si el paciente es diabético y toma **metformina** por favor suspenderla 48 horas antes del procedimiento, al finalizar el procedimiento debe reiniciar la medicación.